

Preparación del Colon con PICOPREP sabor naranja (C.N. 677589.9)

ANTES DE LA PREPARACION

DIETA POBRE EN RESIDUOS DURANTE 3 DIAS ANTES

Alimentos permitidos: caldo de carne, pescado blanco o hervido, tortilla francesa, jamón serrano o cocido, carnes sin grasa a la plancha, agua, café o infusiones, leche desnatada, zumos sin pulpa, caldos colados.

Alimentos prohibidos: verdura, fruta, legumbres, hortalizas, patatas, arroz, pasta, guisos de carne o pescado, embutidos, pan, picos, bollería, chocolate, alcohol y bebidas gaseosas.

24 HORAS ANTES DIETA LIQUIDA sin lácteos a base de: agua, caldos filtrados, zumos, té, café y bebidas sin burbujas (Aquarius, Nestea,etc..)

INSTRUCCIONES DE TOMA DE PICOPREP

PREPARACION si la cita es **POR LA MAÑANA**

El día antes de la exploración a las **18:00 horas** diluir un sobre de **PICOPREP** en un vaso de agua, 30 minutos después de tomarlo tiene que beber **2 LITROS** de líquidos claros como agua, aquarius, te, Nestea, caldos filtrados y zumos sin pulpa.

A las **21:00 PM** horas diluir el segundo sobre de **PICOPREP** en un vaso de agua, 30 minutos después beberá **2 LITROS** de líquidos claros como agua, aquarius , té

PREPARACION si está citado **POR LA TARDE**

A las **7:00 AM** horas diluir un sobre **PICOPREP** en un vaso de agua, después de tomar la preparación 30 MINUTOS despues tiene que beber **2 litros** de líquido (agua,aquarius) hasta la siguiente toma

A las **9:00 AM** horas diluir el segundo sobre de **PICOPREP** en un vaso de agua, 30 MINUTOS después beberá **2 litros** de líquidos claros como agua, aquarius,té

El día de la exploración debe venir en AYUNAS de 5 horas tanto de líquidos y solidos

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (es importante que las lea)

- Deberá venir acompañado a la prueba y no podrá conducir hasta el día siguiente.
- Es importante que traiga los últimos análisis, electrocardiograma (si lo tiene) informes médicos de enfermedades actuales y/o pasadas, así como de operaciones o posibles alergias si existiesen.
- Si presenta fiebre, cuadro catarral o gripal es recomendable retrasar la realización de la prueba.
- Si toma fármacos para la coagulación deberá suspenderlos (consulte con su médico)
- **Para hacer la prueba, es necesario traer la autorización de su Seguro Sanitario (Autorización para el hospital, la endoscopia y la anestesia).**